

**AVERTISSEMENTS AGRICOLES**

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

**ARBO. VITI. RHONE-ALPES**

ABONNEMENT ANNUEL: 90f

REGISSEUR RECETTES D.D.A. CCP LYON 9431-17A



Circonscription RHONE-ALPES

55, rue Mazenod 69426 LYON CEDEX 3

20 Août 1984

N° de série continue 285

Bulletin n° 17

**ARBRES FRUITIERS**

=====

**CARPOCAPSE ° MAINTENIR LA PROTECTION**

Maintenir la protection conseillée dans le précédent Bulletin à la cadence d'un traitement toutes les 3 semaines pour le Dimilin, ou d'un traitement toutes les 2 semaines pour les autres produits.

La lutte sera à reprendre aussi dans les Monts du Lyonnais d'ici la fin de la semaine puisque le 2e vol a commencé.

Par contre, inutile de traiter :

- dans la région du Plateau des Bornes puisque le 2e vol n'a pas débuté

**SUR PRUNIER**

Le vol se poursuit, maintenir la protection

**SUR NOYERS**

Inutile de traiter si le durcissement de la coque a eu lieu.

**TORDEUSE ORIENTALE DU PECHER**

Maintenir la protection en tenant compte des délais d'emploi avant récolte.

**POU DE SAN JOSE ° A SURVEILLER**

Les larves de 2e génération vont commencer à apparaître dans les zones les plus précoces. Surveillez et traitez avec du méthidathion à 60 g ma/hl (Ultracide 20), produit efficace aussi contre le carpocapse.

**ARAIGNEES ROUGES ° CONTROLEZ LES POPULATIONS**

Les pontes d'hiver débutent actuellement.

Pour limiter les infestations du prochain printemps, maintenir la protection à un niveau faible en traitant avec un acaricide spécifique (voir Bulletin du 13 juillet 84)

- respectez les délais d'emploi avant récolte
- mouillez bien la végétation

**CAPUA**

Le 2e vol a débuté depuis une semaine. Dans les vergers habituellement touchés (Savoie, Haute-Savoie), assurer la protection carpocapse avec un produit également efficace contre capua : méthomyl, trichlorfon, acéphate, phosmet.

**OIDIUM DU POMMIER ° PREPAREZ DES A PRESENT LA PROCHAINE CAMPAGNE**

En protégeant la pousse d'Août, vous réduirez le nombre de jeunes pousses oïdiées au printemps prochain.

P499

## V I G N E =====

**RAPPEL** - En cas de grêle, il faut intervenir si possible dans les 24 h, avec un produit à base de folpel, captane ou dichlofluanide, afin de cicatriser et d'empêcher le développement des pourritures diverses. Eviter les traitements cupriques.

### **MILDIU** : DERNIER TRAITEMENT AU CUIVRE

La véraison marque la fin de la période de sensibilité des grappes à la maladie.

Un traitement avec un produit contenant du cuivre sera effectué fin Août, particulièrement dans les parcelles où des taches ont été observées.

Ce traitement favorise l'aoutement des bois et protège le feuillage contre les attaques tardives de mildiou ("point de tapisserie", mildiou "mosaïque") constituant le réservoir de la maladie pour l'année prochaine.

Ce traitement sera le dernier, sauf période pluvieuse importante d'ici fin août.

### **BOTRYTIS** : IL EST TEMPS DE TRAITER

Les conditions climatiques sont devenues plus favorables à l'installation de la maladie et quelques grappes attaquées ont été observées ces jours-ci.

Traitez aux tous premiers signes de la véraison en tenant compte de l'importance du risque dans le choix de vos produits (voir note INRA, ITV, SPV dans notre Bulletin du 29 mai dernier).

#### - dans les zones très sensibles :

- . vignes situées en bas fonds, zones favorables aux rosées ou brouillards prolongés
- . vignes touchées par la grêle ou par des attaques de Tordeuses (Vers de la grappe)

Vous pouvez utiliser un produit à base d'imides cycliques (Sumisclex, Ronilan, Kidan, Rovral)

#### - dans les autres situations :

utilisez Euparène (4 kg/ha), Mycodifol (5 l/ha), Codicap (3,5 kg/ha), BTF (3,5 l/ha) ou tout autre produit apportant 2 kg de folpel/ha.

Avec ces produits, ne pas retarder le traitement après le tout début véraison.

BIEN LOCALISER LE TRAITEMENT AU NIVEAU DES GRAPPES,  
DE CHAQUE COTE DU RANG

## **OIDIUM**

La protection s'achève à la véraison.

### **ARAIGNEES ROUGES ET JAUNES** : PENSEZ DEJA A 1985

La chaleur a favorisé leur développement.

Dans les parcelles fortement attaquées cette année (présence d'au moins une araignée sur plus de 30 % des feuilles) un traitement réalisé maintenant limitera le dépôt des oeufs d'hiver, ou limitera le nombre d'adultes hivernants, donc les infestations au prochain printemps.

- choisissez un acaricide spécifique
- mouillez bien la végétation

## **BLACK-ROT**

Les attaques sur feuilles ont été assez limitées cette année.

Cependant, dans les vignes atteintes, le risque sur grappe persiste pratiquement jusqu'à la récolte, pour peu qu'il y ait des précipitations suffisantes.

Restez vigilant, partout où la maladie existe sur feuilles.

Les traitements cupriques contre le mildiou sont insuffisants ; recourir au captafol ou au dithiocarbamates.

## **VERS DE LA GRAPPE**

Le 2e vol (Cochylis et Eudémis) se termine.

Le 3e vol d'Eudémis qui a lieu habituellement dans les secteurs les plus méridionaux n'a pas encore commencé.